

氟苯尼考子宫注入剂

Fubennikao Zigongzhuruji

Florfenicol Intrauterine Infusion

本品为氟苯尼考与适宜溶剂制成的灭菌溶液。含氟苯尼考（ $C_{12}H_{14}Cl_2FNO_4S$ ）应为标示量的 95.0%~105.0%。

【性状】 本品为无色至淡黄色液体。

【鉴别】 ~~取本品，照氟苯尼考项下的鉴别（1）试验，显相同的结果。~~在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】 颜色 取本品，与黄色 4 号标准比色液（附录 0901 第一法）比较，不得更深。

无菌 取本品，转移至 200ml 灭菌丙二醇中，混匀，经薄膜过滤法处理，分别以 1% 聚山梨酯 80 的 0.1% 无菌蛋白胨水溶液和 0.9% 氯化钠溶液为冲洗液，依法检查（附录 1101），应符合规定。

其他 应符合子宫注入剂项下有关的各项规定（附录 0115）。

【含量测定】 取本品适量，精密称定，加流动相定量稀释制成每 1ml 约含氟苯尼考 50 μ g 的溶液，照氟苯尼考项下的方法测定。另取本品，同时测定其相对密度，将供试品量换算成毫升数，计算，即得。

【规格】 25ml : 2g

【贮藏】 密闭保存。