

蜂螨酊

Fengman Ding

【处方】 百部 1000g 马钱子（制）1000g 烟叶 1000g

【制法】 以上3味，粉碎成中粉，混匀。加乙醇适量，浸渍~~48小时~~，回流提取2次，~~每次1.5~2小时~~，滤过，合并提取液，静置待沉淀完全，倾出上清液，浓缩至约1500ml，滤过，即得。

【性状】 本品为黄棕色的液体。

【鉴别】 取本品10ml，水浴蒸干，残渣分别用稀硫酸5ml、2ml溶解后，并入分液漏斗中，用三氯甲烷振摇提取2次，每次5ml，合并三氯甲烷液，加水3ml振摇洗涤，取水层，合并于酸液中，弃去三氯甲烷液，酸液用浓氨试液调节pH值至9~10，用三氯甲烷提取2次，每次5ml，合并三氯甲烷液，蒸发至约1ml，作为供试品溶液。另取~~土的宁对照品、马钱子碱对照品~~~~马钱子总生物碱对照提取物适量~~，加三氯甲烷制成每1ml各含~~约~~2mg的混合溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录0502）试验，吸取上述两种溶液各5 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以甲苯-丙酮-乙醇-浓氨试液（4:5:0.6:0.4）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以稀碘化铋钾试液。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 乙醇量 应为80%~90%（附录0711）。

其他 应符合酊剂项下有关的各项规定（附录0109）。

【功能】 杀灭蜂螨。

【主治】 蜜蜂寄生螨。

【用法与用量】 加3~5倍水稀释喷雾，每标准群100~200ml。

【注意事项】 采蜜期禁用。

【贮藏】 密封，置阴凉处。